

"СОГЛАСОВАНО"



2
Директор НИИ дезинфектологии
и гигиены
Минздрава России, академик РАМН

М. Г. Шандаа
2003 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный представитель

«Кеминова А/С», Дания

Иеспер Эйхен
2003 г.

NA/S 177122

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства инсектицидного "Фуфанон-супер"

(фирма "Кеминова А/С", Дания).

Москва, 2003

Инструкция по применению инсектицидного средства «Фуфанон-супер» фирмы «Кеминова А/С» (Дания).

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом
дезинфектологии Минздрава России
Авторы: Л.С. Путинцева, Т.З.Рысина, Зайцева Г.Н.

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Фуфанон- супер» представляет собой водную эмульсию от белого до светло-желтого цвета, со специфическим запахом, содержащее в качестве действующего вещества (ДВ) малатион (440 г/л), а также поверхностно-активное вещество (ПАВ), растворитель, стабилизатор, загуститель, буферный раствор и инертный наполнитель до 100%. Упаковка — пластиковые бутылки массой нетто 1 л, канистры массой нетто 5 л. Срок годности 3 года со дня изготовления. Хранить в сухих проветриваемых складских помещениях.

1.2. Средство «Фуфанон-супер» обладает широким спектром инсектицидного действия в отношении синантропных тараканов, мух, блох, постельных клопов, рыжих домовых муравьев, комаров. Длительность остаточного действия 30-35 суток в зависимости от вида насекомых.

1.3. По степени воздействия на организм теплокровных животных в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 , «Фуфанон-супер» при введении в желудок относится к 3 классу умеренно-опасных средств, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных средств. По зоне острого биоцидного действия относится к (2 и 3) классу высоко и умеренно опасных средств по Классификации степени опасности средств. Зона острого действия 15 , зона подострого действия 10. Пары водной эмульсии средства «Фуфанон-супер» в условиях насыщающих концентраций ингаляционно опасны (2) класс опасности. Обладает кожно-резорбтивным действием. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны составляет 0,5 мг/м³.

1.4. Средство «Фуфанон-супер» предназначается для уничтожения синантропных тараканов, мух, блох, постельных клопов, рыжих домовых муравьев и комаров на объектах различного назначения: производственные, пищевые, лечебно-профилактические учреждения (кроме палат, операционных и реанимационных помещений), жилые в отсутствие людей, детские (кроме спален и игровых комнат) в отсутствие детей; а также против комаров (личинки) в природных водоёмах нерыбохозяйственного значения и городских водоёмов (в водоёмах подвалов жилых домов, сточных водах, пожарных ёмкостях); против комаров (имаго) в хорошо вентилируемых помещениях, а также для обработки наружных стен строений.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

2.1. Для приготовления водной эмульсии средства используют любую воду комнатной температуры.

2.2. Водные эмульсии «Фуфанон-супер» готовят из концентрата эмульсии на водной основе. Для приготовления рабочей эмульсии навеску средства «Фуфанон-супер» разводят в соответствующем количестве воды комнатной температуры: расчёт представлен в таблице.

Таблица

| Название вида насекомого | Количество средства поДВ | Количество средства в мл препарату | Количество воды в мл приготовления 1 л рабочей |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Рыжие тараканы | 0,48 | 11,0 | 989,0 |
| Пепельные тараканы | 0,66 | 15,0 | 985,0 |
| Американские тараканы | 0,88 | 20,0 | 980,0 |
| Мухи: | | | |
| личинки | 0,48 | 11,0 | 989,0 |
| имаго | 0,40 | 9,0 | 991,0 |
| Блохи | 0,15 | 3,5 | 996,5 |
| Постельные клопы | 0,15 | 3,5 | 996,5 |
| Рыжие домовые | 0,15 | 3,5 | 996,5 |
| Комары: | | | |
| личинки | 0,07 | 1,5 | 998,5 |
| имаго | 0,15 | 3,5 | 996,5 |

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

Для уничтожения рыжих тараканов средство «Фуфанон-супер» в количестве 11 мл развести в 989,0 мл воды и соответственно 15 или 20 мл развести в 985,0 и 980,0 мл воды для уничтожения пепельных и американских тараканов.

Инсектицидное средство наносят на предметы обстановки, в местах обитания тараканов и на путях их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем (особенно в местах их ввода и вывода), щели в стенах, за дверными коробками, вокруг раковин, под ванной и т.п., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и др.

Норма расхода инсектицидного средства «Фуфанон-супер» составляет 100 мл/м² обрабатываемой поверхности. Обработку проводят одновременно во

всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселенности помещений насекомыми обрабатывают смежные помещения в целях ограждения их от заселения тараканами. Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию).

3.2. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ

Для уничтожения имаго мух на открытом воздухе инсектицидным средством «Фуфанон-супер» обрабатывают мусоросборники и ограждения вокруг них, свалки, стены: дворовых построек, скотных сараев, дворовых туалетов и прочих построек. Норма расхода водной эмульсии 100 мл/м².

Для уничтожения личинок комнатных мух в жидких отбросах рекомендуется 11 мл развести 989,0 мл воды при слое жидких отбросов толщиной до 0,5 м. Норма расхода средства 500 мл/м². Для обработки твердых отбросов толщиной слоя до 0,5 м рекомендуется 11 мл развести 989,0 мл воды при норме расхода 1л/м² и при глубине отбросов свыше 0,5 м - 2 л/м². Обработке подлежат: выгребные ямы, дворовые туалеты, отходы и пищевые отбросы.

3.3. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ

Для уничтожения блох в помещениях инсектицидным средством «Фуфанон-супер». Обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены и др. на высоту до 1 м. Средство в количестве 3,5 мл разводят в 996,5 мл воды. Норма расхода 100 мл/м² обрабатываемой поверхности. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3.4. УНИЧТОЖЕНИЕ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ

Для уничтожения постельных клопов инсектицидным 3,5 мл средства «Фуфанон-супер» разводят в 996,5 мл воды. Водную эмульсию средства наносят на места обитания и концентрации насекомых. Обрабатывают щели в стенах и мебели, кровати, за плинтусами из расчета 100 мл/м². Постельные принадлежности не обрабатывать!

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3.5. УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ

Для уничтожения окрылённых комаров в помещениях 3,5 мл средства «Фуфанон-супер» разводят в 996,5 мл воды. Средством орошают выборочно места посадки комаров в хорошо проветриваемых помещениях, а также наружные стены строений.

Норма расхода составляет 50 мл/м² на непьющих жидкость поверхностях (стекло, кафель) и 100 мл/м² на впитывающих жидкость.

Для уничтожения личинок комаров 1,5 мл средства «Фуфанон-супер» разводят в 998,5 мл воды. Средство равномерно разбрызгивают по

5

поверхности водной глади природных водоёмов нерыбохозяйственного значения и городских водоёмов: в подвалах жилых домов, сточных водах, пожарных ёмкостях при норме расхода жидкости 200 мл/м². Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям с появлением в них личинок комаров 2-3 возраста.

3.6. УНИЧТОЖЕНИЕ РЫЖИХ ДОМОВЫХ МУРАВЬЕВ.

Для уничтожения рыжих домовых муравьев 3,5 мл средства «Фуфанон-супер» разводят в 996,5 мл воды. Обрабатывают места передвижения (дорожки) и скопления муравьев. Норма расхода средства 100 мл/м².

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. К транспортированию средство предъявляется как опасный груз.

4.2. Средство следует хранить в закрытых, сухих складских помещениях. Температурный режим транспортирования и хранения не ниже 30°С и не выше плюс 50°С.

4.3. Упаковка должна быть герметичной.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Приготовление рабочих эмульсий средства и обработку помещений проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, глаза - защитными очками, а органы дыхания - универсальными респираторами РПГ-67 или РУ-60 М с патроном марки «А». При отсутствии респираторов можно использовать общеобщевойсковой противогаз.

5.2. Обработку помещений следует проводить при открытых форточках (окнах) в отсутствие людей, домашних животных, птиц, а аквариумы плотно укрыть или удалить из помещений.

5.3. При обработке цехов промышленных предприятий предварительно надо убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать средство.

5.4. После обработки помещения провести проветривание не менее 30 мин.

5.5. На открытых поверхностях (столы, тумбочки и др.) после обработки провести влажную уборку помещения мыльно-содовым раствором. Уборку проводить в резиновых перчатках.

5.6. Во время работы с концентратом средства «Фуфанон супер» и рабочими водными эмульсиями запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. После завершения работы вымыть руки, лицо и прополоскать рот.

5.7. Избегать попадание средства в глаза и на кожу.

5.8. Хранить средство и рабочую эмульсию в помещении, недоступном для лиц, не имеющих отношения к работе с ним, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

5.9. Слив средства в канализацию запрещается без предварительного разбавления до концентрации рабочих растворов.

5.10. Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями и высокочувствительным к лекарственным препаратам использовать средство с осторожностью.

5.12. По окончании работы спецодежда проветривается и хранится в отдельном шкафу. Она подлежит стирке по мере загрязнения (не реже одного раза в 10 дней) в горячем мыльно-содовом растворе (50 г каждого на ведро воды).

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиваться у человека отравление.

6.1. Признаки отравления: неприятный привкус во рту, слюнотечение, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи) боли в

животе, сужение зрачка, раздражение органов дыхания. Возможно раздражение слизистых.

6.2. При отравлении через дыхательные пути и случайном попадании в желудок вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды.

6.3. При случайном попадании препарата в глаза тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно в течение нескольких минут. При появлении раздражения слизистой глаз закапать 30% сульфацил натрия, при болезненности 2% раствора новокаина.

6.4. При попадании средства на кожу снять капли суспензии ватным тампоном или ветошью и т.п., и не втирая, вымыть загрязненный участок мылом.

6.5. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. Лечение симптоматическое. Для всех ФОС специфическим противоядием является атропин и препараты красавки.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Настоящая инструкция подлежит применению только для контрольных

исследований инсектицидного средства «Фуфанон-супер»

По спецификации:

Внешний вид и цвет средства определяется визуальным осмотром,

представительной пробы.

В соответствии с требованиями нормативной документации средство «Фуфанон-супер» охарактеризовано следующими параметрами:

- внешним видом - жидкость от белого до светло-желтого цвета, со специфическим запахом

- массовой долей малатиона, составляющей по весу $(42,8 \pm 2,0)\%$ или 44% по объему.

Контроль качества средства следует проводить по данным параметрам.

7.1. Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром, представительной пробы.

7.2. Определение массовой доли малатиона определяется методом ГЖХ с использованием пламенно-ионизационного детектора, изометрического хроматографирования и количественной оценки действующих веществ методом абсолютной градуировки.

7.2.1. Оборудование, реактивы:

- хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором;

- колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и диаметром

0,3, заполненная хроматомом N-AW-DMCS с 5% SE-30;

- малатион технический, образец сравнения фирмы «UFL», Индия, 98,0% основного вещества;

стандартный раствор малатиона в четыреххлористом углероде концентрации $2,0 \text{ мг/см}^3$;

- углерод четыреххлористый, марки «х.ч.»;

- ацетон марки «х.ч.»

7.2.2. Приготовление градуировочного раствора.

Для приготовления градуировочной смеси навеску малатиона около 0,05 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г растворяют в 15 см^3 четыреххлористого углерода, раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 см^3 и доводят объём растворителем до метки. Концентрация малатиона составила $2,0 \text{ мг/см}^3$.

7.2.3. Приготовление анализируемого раствора.

Для приготовления анализируемого раствора навеску 0,1 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г, растворяли в 20 см^3 растворителя (смесь ацетона и четыреххлористого углерода в соответствии 1:4), аликвоту полученного раствора сушили над прокаленным сульфатом натрия в течение 30 минут, фильтровали и хроматографировали не менее 3-х раз параллельно со стандартным раствором. Расчет хроматограмм проводился по высотам (площадям) хроматографических пиков.

7.2.4. Условия хроматографирования ; температура колонки - 190°C ; температура испарителя - 220°C ; температура детектора - 200°C ; чувствительность шкалы электрометра - 10×10^{-10} а; время удерживания малатиона - 2 мин. 25 сек.

7.3. Обработка результатов анализа

Массовую долю малатиона (X) в процентах рассчитывают по формуле;

$$X = \frac{N_x \cdot C_{гр} \cdot Y_x}{N_{гр}} \cdot \frac{100}{m_x}, \text{ где}$$

N_x и $N_{гр}$ - высоты хроматографических пиков малатиона в анализируемом и градуировочном растворах, мм;

$C_{гр}$ - концентрация малатиона в градуировочном растворе мг/см^3 ;

m_x - масса навески средства «Фуфанон- супер», г.;

Y_x - объём анализируемого раствора, см^3 ;

За результат измерения принимают среднее арифметическое из трех параллельных определений, абсолютное расхождение между наиболее различающимися значениями, которых не превышает допустимое для малактиона $\pm 0,4\%$. Пределы относительной суммарной погрешности составляют:

$\pm 1,0\%$ для малактиона при доверительной вероятности $P=0,95$.