

Рекомендации по применению родентицидного препарата «ШТУРМ – парафинированный брикет»

Разработаны НПО «Гарант» на основании методических указаний
ЦГСЭН РФ и опыта практического применения средства.

1. Состав и назначение

- 1.1 Парафинированные брикеты «Штурм» предназначена для борьбы с различными видами грызунов на объектах различного назначения как в помещениях, так и на открытой территории, подлежащих дератизации. Особо рекомендуется применение приманки на объектах с повышенной влажностью (в т. ч. подвалах), переменными температурами, а также для создания долговременных точек отравления.
- 1.2 «Штурм» представляет собой высокоэффективную готовую приманку в виде брикетов различной формы на основе зерновой смеси с содержанием в качестве действующего вещества 0,005% бродифакума - антикоагулянта 2-го поколения. Летальную дозу грызуны набирают после однократного поедания приманки; гибель грызунов наступает на 4 – 15 день после поедания приманки «Штурм».

2. Способ применения

Приманку раскладывают на подложки или в специальные контейнеры и размещают по периметру обрабатываемого помещения вблизи мест выхода или кормления грызунов, а также там, где замечены следы их жизнедеятельности (погрызы, экскременты).

3. Нормы расхода

Для мышей на одну подложку размещают по 1 – 2 брикета для мышей и по 2 – 4 брикета для крыс. Подложки расставляют через 3-15 метров в зависимости от захламленности помещений и численности грызунов. Приманка добавляется по мере ее поедания грызунами. Загрязненную и оставшуюся приманку, а также погибших грызунов необходимо сжечь или закопать на глубину не менее 0,5 м.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Хранить приманку отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных детям и домашним животным.
- 4.2 При работе с приманкой необходимо использовать СИЗ: перчатки, халат, а также соблюдать общие правила личной гигиены: не пить, не курить, не принимать пищу. По окончании работы вымыть руки и лицо с мылом.
- 4.3 При случайном попадании средства на кожу и слизистые промыть их большим количеством воды. При случайном заглатывании средства необходимо выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем принять 10 измельченных таблеток активированного угля и немедленно обратиться к врачу. Антидот – витамин К (викасол, фитоменадион).

Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.01.002.E.002958.07.16 от 15.07.2016 г.

ТУ № 9392-007-43870295-2004

Класс опасности – IV

По вопросам приобретения препарата и дополнительных консультаций

обращаться в ООО НПО «ГАРАНТ» по адресу:

443077, г. Самара, УЛ. Свободы/Кузнецкая, 180/31

тел.(факс) (846) 372-71-70

e-mail: garant1@mail.samtel.ru; www.npo-garant.com